

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Dioxy Activ Supra *Koncentrat*

Tečno sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju na bazi hlordioksida

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Mjesto upotrebe	Način upotrebe	Način razblaženja
<i>Mašine, aparati i oprema</i>	Proizvod se razrijedi sa vodom u odnosu 1:1000 . Zavisno od stepena mikrobnog onečišćenja mašine, aparati i oprema jednokratno se i višekratno brišu ili prskaju ovako pripremljenim rastvorom.	1 čep boce od 1l razblažiti sa 5 litra pitke vode. 1 čep kanistera od 5l razblažiti sa 15 litara pitke vode. 1 čep kanistera od 10l razblažiti sa 15 litara pitke vode.
<i>Radne površine, prijevozna sredstva, prostorije i sanitarije</i>	Proizvod se razrijedi sa vodom u odnosu 1:1000 . Zavisno od stepena mikrobnog onečišćenja radne površine, prijevozna sredstva, podovi, zidovi, stropovi i sanitarije jednokratno se i višekratno brišu ili prskaju ovako pripremljenim rastvorom.	1 čep boce od 1l razblažiti sa 5 litra pitke vode. 1 čep kanistera od 5l razblažiti sa 15 litara pitke vode. 1 čep kanistera od 10l razblažiti sa 15 litara pitke vode.
<i>Ruke</i>	Proizvod se razrijedi sa vodom u odnosu 1:1000 . Ovako pripremljenim rastvorom ruke jednokratno ili višekratno poprskati i dobro utrljati ili uroniti ih u rastvor pa dobro utrljati.	1 čep boce od 1l razblažiti sa 5 litra pitke vode. 1 čep kanistera od 5l razblažiti sa 15 litara pitke vode. 1 čep kanistera od 10l razblažiti sa 15 litara pitke vode.

1 čep boce od 1l = 5 ml; 1 čep kanistera od 5l = 15 ml; 1 čep kanistera od 10l = 15 ml

Uputstvo za upotrebu zasnovano je na našim iskustvima i može biti korigovano zavisno od uslova primjene.

Pripremljen radni rastvor iskoristiti u roku od 24h.

Nakon upotrebe nije potrebno ispiranje.

KONTAKTNO VRIJEME:

Kontaktno vrijeme zavisi od stepena mikrobnog onečišćenja kao i od načina upotrebe (**60s do 30min**).

ITR d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge

Jahijela Fincija 28

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel./Fax. +387 (0)33 629 771

www.itr.ba / info@itr.ba