

Mašine	Dezinfekciju mašina vršiti prije i poslije upotrebe. Pripremljen rastvor nanijeti na prethodno oprane mašine.
Pribor i posude	Pribor i posude koje dolaze u dodie s mesom dezinficirati prije početka rada, nakon svake stanke i kad god su prljavi. Pripremljen rastvor nanijeti na prethodni opran pribor i posude.
Radne površine	Dezinfekciju vršiti prije i poslije upotrebe. Pripremljen rastvor nanijeti na prethodno oprane površine.
Hladnjače	Hladnjače minimalno jedanput sedmično dezinficirati. Pripremljen rastvor nanijeti na prethodno oprane podove, zidove, stropove i police.

Upotreba u proizvodnji mlijeka

Vimena	Dezinfekciju vršiti prije i poslije mužnje. Pripremljen nastvor nanijeti na prethodno oprane sise i područje oko sisa. Nakon dezinfekcije može se odmah pristupiti mužnji.
Izmužišta	Dezinfekciju vršiti minimalno jedamput sedmično. Pripremljenim rastvorom naprskati prethodno očišćene površine. Nanositi 400 do 500 ml rastvora po m ² površine.
Muzni uređaji	Dezinfekciju vršiti prije i poslije mužnje. Pripremljen rastvor nanijeti na prethodno očišćene/oprane uređaje
Laktofrizi	Dezinfekciju vršiti prije i poslije upotrebe. Pripremljen rastvor nanijeti na prethodno oprane površine.
Mljekovodi	Dezinfekciju vršiti prije i poslije upotrebe. Sredstvo dozirati proporcionalno protoku pitke vode ili ga prethodno razblažiti sa vodom u odnosu 1:1000 (1l sredstva na 1000l vode) i direktno dozirati u mljekovod.
Radne površine, oprema i posude	Dezinfekciju vršiti prije i poslije upotrebe. Pripremljen rastvor nanijeti na prethodno oprane površine.
Dezinfekcija ruku u proizvodnji mesa i mlijeka	Ruke treba uvijek prije početka rada, nakon korištenja toaleta, nakon završetka čišćenja, nakon dodira prljavih predmeta i površina i nakon rukovanja sa kritičnim namirnicama (meso, riba, unutrice, jaja) toplom vodom i sapunom oprati pa dezinficirati. Nanijeti 3-5ml pripremljenog rastvora na suhe ruke i dobro utrljati.

Način pripreme različitih razblaženja

Količina rastvora	Razblaženje			
	1:500	1:1000	1:10000	1:20000
	Potrebna količina Dioxy Activ Supra FARM			
1l	2ml	1ml	0,1ml	0,05ml
10l	20ml	10ml	1ml	0,5ml
20l	40ml	20ml	2ml	1ml
50l	100ml	50ml	5ml	2,5ml
100l	200ml	100ml	10ml	5ml
200l	400ml	200ml	20ml	10ml
500l	1l	500ml	50ml	25ml
1000l	2l	1l	100ml	50ml

Dioxy Activ Supra FARM

Tečno koncentrovano sredstvo za brzu, efikasnu i produženu dezinfekciju u primarnoj i sekundarnoj stočarskoj proizvodnji na bazi hlordioksida

SASTAV I OSOBINE:

Dioxy Activ Supra FARM je koncentrovani rastvor hlordiokisa. Djeluje na bakterije (uklj. *Mycobacterium avium*, *Fusobacterium necrophorum*, *Salmonella*, *Campylobacter*), gljivice (uklj. *Aspergillus flavus*, *Penicillium Viridactum*), virusi (uklj. *Influenza-A-Virus*, *Bovine-Virusdiarrhoe-Virus*) i alge.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Prije dezinfekcije potrebno je izvršiti mehaničko čišćenje/pranje.

Dioxy Activ Supra FARM prije upotrebe razblažiti sa vodom u odnosu 1:1000.

Objekti za uzgoj i smještaj životinja	Atomizerom ili klasičnom prskalicom više puta temeljito naprskati sve površine od plafonskih do podnih, posebno rešetkasti pod. Nanositi 400 do 500ml pripremljenog rastvora po m ² površine . Na farmama muznih krava, junadi, ovaca, koza i svinja: Objekat u ljetnim periodima 2 puta sedmično, a u zimskim jednom sedmično dezinficirati. Tretirati čak po životinjama bez iseljavanja van objekta. Temeljito mehaničko čišćenje i dezinfekciju objekta vršiti minimalno jednom godišnje, te kada se pojave uzročnici bolesti. Na živinarskim farmama: tretirati objekat nakon mehaničkog čišćenja i prije useljavanja čak i po slami-stelji. Životinje se mogu useliti već nakon 30 minuta. Njegovom primjenom znatno se smanjuje upotreba lijekova i održava zdravlje životinja. <i>Dezinfekcija zemljišnih podova:</i> Prije dezinfekcije zemljišnih podova otkopati površinski sloj zemlje (10 cm) i nasuti zdrave, nezaražene zemlje s drugog mjesta. U ovom slučaju sredstvo razblažiti sa vodom u odnosu 1:500 . Ovako pripremljenim rastvorom pomoću prskalice naprskati podove. Nanositi 100 ml rastvora po m ² površine.
Hranilice, pojilice i posude	Hranilice, pojilice i posude minimalno jedanput sedmično dezinficirati (da bi se spriječila zaraza), te kada se pojave uzročnici bolesti. Pripremljenim rastvorom naprskati prethodno očišćene hranilice, pojilice i posude.
Papci	Na ulazu u objekat postaviti dezbarijere kako bi životinje svaki put dezinficirale papke radi sprječavanja učestalost zarazne šepavosti, koja ja najveći uzročnik slabije kondicije, a time i slabijeg zdravlja životinja. Preventivna dezinfekcija radi sprječavanja dejstva bakterija na kožu u interdigitalnom prostoru se vrši svake treće ili četvrte sedmice. Dezinfekcija nakon obrezivanja papaka se sprovodi 2 puta godišnje u trajanju od 5 dana pri tretmanu 3 puta dnevno. Dezbarijere postaviti na izlazu iz izmužišta kuda se krave kreću.
Oprema za korekciju papaka	Opremu za korekciju papaka prije početka rada i prije upotrebe na drugoj životinji dezinficirati.

Površinske ozljede, ogrebotine i ubodi	Odmah dezinficirati radi sprječavanja nastanka infekcije rane. Direktno naprskati na papke, kopita ili ozljede. Pripremljen rastvor se smije koristiti i na otvorenim ranama.
Porodajni bokosovi	Porodajne boksove prije i poslije poroda dezinficirati (da bi se spriječila zaraza), te nakon iseljenja životinja. Nanositi 400 do 500ml pripremljenog rastvora po m ² površine.
Boksovi/odjeljci za mladunčad	Temeljito mehaničko čišćenje i dezinfekciju boksova/odjeljaka vršiti prije ulaska i nakon iseljenja mladunčadi, te kada se pojave uzročnici bolesti. Nanositi 400 do 500ml pripremljenog rastvora po m ² površine.
Oprema i uređaji koji se prenose iz jedne grupe životinja u drugu ili iz jedne prostorije u drugu	Dezinfekciju vršiti prije svakog prenosa opreme i uređaja kako bi se spriječilo prenošenje bolesti.
Ostali uređaji i oprema	Dezinfekciju vršiti prije i poslije upotrebe.
Transportna oprema i vozila	Transportnu opremu i vozila dezinficirati prije i poslije svakog transporta životinja i prije ulaska/unosa na farmu.
Prostor i oprema za čišćenje transportne opreme i vozila	Prostor i opremu za čišćenje transportne opreme i vozila dezinficirati prije i poslije upotrebe.
Dezinfekcija ruku na farmama	Ruke dezinficirati prije ulaska u objekat, između odlaska iz jedne grupe životinja u drugu, nakon dodira prljavih površina, te nakon izlaska iz objekta. Nanijeti 3-5ml pripremljenog rastvora na prethodno oprane i suhe ruke i dobro utrljati.

Dezbarijere (ljudi, životinje, vozila)	Sredstvo razblažiti sa vodom u odnosu 1:500 (20ml sredstva na 10l vode). Ovako pripremljen rastvor nasuti u prethodno oprane (ako je to potrebno) dezbarijere. Dezinfekcioni rastvor se može koristiti dva-tri dana. Ako rastvor postane previše prljav, treba ga zamijeniti.
---	--

Valionice	Dezinfekciju valionice vršiti prije ulaska nove serije jaja. Pripremljenim rastvorom više puta temeljito naprskati prethodno očišćen i osušen prostor (zidove, podove, stropove, itd.)
Inkubatori	Dezinfekciju vršiti prije ulaska nove serije jaja. Pripremljenim rastvorom naprskati prethodno očišćene površine. Ukoliko jaja puknu ili eksplodiraju u inkubatoru značajno se podiže razina kontaminacije ako se odmah ne dezinficira. Primjena dezinficijensa na kontaminiranom području uz redovito svakodnevno zamagljivanje dezinficijensom smanjuje rizik od kontaminacije.
Jaja	Dezinfekciju jaja vršiti prije ili nakon unosa u inkubatore/valionice. Za pripremu rastvora koristiti vodu topliju (ne vrelu) od jaja, jer kad je voda hladnija onda bakterije mogu da prodiru kroz pore u unutrašnjost te tako oštete jaje. Pripremljenim rastvorom naprskati prethodno očišćena (ako je to potrebno) jaja.
Konzumna jaja	Dezinfekciju konzumnih jaja izvršiti u nutar 2 sata nakon što su snesena. Za pripremu rastvora koristiti vodu topliju (ne vrelu) od jaja, jer kad je voda hladnija onda bakterije mogu da prodiru kroz pore u unutrašnjost te tako oštete jaje. Pripremljenim rastvorom naprskati prethodno mehanički očišćena jaja.
Zrak	Dezinfekciju zraka vršiti na kraju svakog radnog dana. Kako bi se suzbile bolesti koje se prenose zrakom i dezinfikovala nedostupna mjesta u valioniku potrebno je pripremljen rastvor nanijeti uz pomoć šprice koja daje sitne čestice.

Upotreba u proizvodnji mesa

Prostorije za prihvatanje i privremeni smještaj životinja za klanje (depo)/Obori za držanje životinja prije klanja	Dezinfekciju vršiti prije prihvata i poslije iseljenja životinja. Pripremljenim rastvorom više puta temeljito naprskati prethodno očišćen i osušen prostor (zidove, podove, stropove). Nanositi 400 do 500 ml rastvora po m ² površine.
Klaonice	Klaonice dezinficirati prije i poslije klanja. Pripremljenim rastvorom više puta temeljito naprskati prethodno očišćen i osušen prostor (zidove, podove, stropove). Nanositi 150 do 200 ml rastvora po m ² površine.

U slučaju velikog mikrobiološkog opterećenja *Dioxy Activ Supra FARM* razblažiti sa vodom u odnosu do 1:500.

Voda	Koncentrat dozirati proporcionalno protoku vode ili direktno u spremnik za vodu u odnosu od 1:10000 do 1:20000.	Voda je odmah spremna za piće.
	U slučaju velikog mikrobiološkog i organskog opterećenja (ostaci aditiva, hrane, itd.) koncentrat dozirati u vodu u odnosu do 1:1000	